



BioDea

SCHEMA COLTURALE

*"il Riso"*



BAGNATURA SEME	DOSE
Irrorazione dei semi prima della semina	1:600 o 167 ml/hl
TRATTAMENTO PRE-SEMINA	DOSE
da 1 a 2 Irrorazioni del terreno pre e post erpicatura	1:100 o 1.000 ml/hl
TRATTAMENTO FOGLIARE	DOSE
Intervenire periodicamente in copertura con trattamenti fogliari, in particolare trattare tra lo sviluppo del panicolo e lo sviluppo delle cariossidi	1:500 o 200 ml/h
<i>Ripetere ogni 7/10 giorni in base alle condizioni stagionali e per rendere l'ambiente sgradito agli insetti e parassiti nei periodi più critici</i>	

**Compatibilità:**

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.  
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità sulle colture su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

**Avvertenze:**

Da impiegare esclusivamente in agricoltura.  
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.  
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.