



BioDea

SCHEMA COLTURALE

*"il Ciliegio"*

Famiglia: Rosaceae



### Nuovi impianti

Prima del trapianto di nuovi astoni, come effetto starter ed antistress effettuare inzaffardatura delle piantine con una soluzione di Distillato di Legno al 1:700 dose 143ml/hl oppure post potatura della radice nuda immergere in acqua e distillato di Legno dose 1:700 o 143ml/hl per 2/3 ore per ottenere una migliore radicazione, attecchimento e protezione.

TRATTAMENTI FOGLIARE	DOSE
Post potatura di allevamento irrorare anche tutto il tronco in particolare alla base della pianta.	1:300 o 333 ml/hl
Post eventi atmosferici avversi (gelate e grandinate)	1:300 o 333 ml/hl
Post potatura germogli, rami e succhioni	1:300 o 333 ml/hl
Trattamento fogliare ogni 10- 15 gg	1:500 o 200 ml/hl
Trattamento periodico estivo	1:200 o 500 ml/hl
FERTIRRIGAZIONE	DOSE
trattamento ogni 7 /10 giorni nel periodo vegetativo nell'ultima fase di irrigazione	1:250 o 400 ml/hl
<i>Prevedere una fertirrigazione in fase di trapianto 1:400 o 250 ml/hl nella ultima fase di irrigazione.</i>	

### Impianti in produzione

Ripetere ogni 7/10 giorni in base alle condizioni stagionali e per rendere l'ambiente sgradito agli insetti e parassiti nei periodi più critici

TRATTAMENTI FOGLIARE	DOSE
Post raccolta	1:500 o 200 ml/hl
Post potatura verde	1:300 o 333 ml/hl
Post potatura di produzione	1:300 o 333 ml/hl
Post potatura dei succhioni ed eventuali operazioni di incisione anulare	1:500 o 200 ml/hl
Gemma ferma irrorare anche tutto il tronco in particolare alla base della pianta	1:500 o 200 ml/hl
Gemma ingrossata	1:500 o 200 ml/hl
Primi sviluppi vegetativi	1:500 o 200 ml/hl
Bottoni floreali	1:600 o 166 ml/hl
Fioritura (solo se ci sono attacchi in corso)	1:800/ 1:1.000 o 125/100 ml/hl - trattamento mirato
Caduta petali (terminata la fioritura) e Allegagione	1:500 o 200 ml/hl
Accrescimento del frutto	1:500 o 200 ml/hl
<i>Ripetere ogni 7/10 giorni in base alle condizioni stagionali e per rendere l'ambiente sgradito agli insetti e parassiti nei periodi più critici</i>	
FERTIRRIGAZIONE	DOSE
Durante le fasi vegetative	1:250 o 400 ml/hl – ripetere ogni 15 giorni
Durante il riposo vegetativo	1:300 o 333 ml/hl – ripetere ogni 30 giorni
<i>Distribuire nell'ultima fase di irrigazione</i>	

#### Compatibilità:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità sulle colture su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

#### Avvertenze:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.