



BioDea

SCHEMA COLTURALE

"il Grano"

Famiglia: Poacee



TRATTAMENTO PRE- SEMINA	DOSE
Nebulizzazione del terreno 15 gg. prima della semina	1:100 o 1lt/hl
TRATTAMENTO ALLA SEMINA	DOSE
Irrorare il terreno all'atto della semina	1:400 o 250 ml/hl
TRATTAMENTI FOGLIARE	DOSE
Dalla 3°/4° foglia inizio accestimento e fino a fine accestimento	1:500 o 200 ml/hl
Da inizio levata fino allo stadio di botticella	1:400 o 250 ml/hl
<i>Intervenire in concomitanza di trattamenti fitosanitari e concimazioni, può essere ripetuto ogni 6/7 giorni in base alle condizioni stagionali e nei periodi più critici per rendere l'ambiente sgradito ad insetti ed agenti patogeni.</i>	

Compatibilità:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità sulle colture su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Avvertenze:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.