



BioDea

SCHEMA COLTURALE

"la Colza"

Famiglia: Brassicaceae



TRATTAMENTO PRE- SEMINA	DOSE
Nebulizzazione del terreno 15 gg. prima della semina	1:100 o 1lt/hl
TRATTAMENTO POST SEMINA	DOSE
bagnatura	3/5 litri/ha
TRATTAMENTI FOGLIARE	DOSE
si consigliano almeno 3 trattamenti fogliari alla formazione della rosetta, levata e alla formazione dei bottoni fiorali	200-250 ml / hl
<p><i>intervenire in concomitanza di trattamenti fitosanitari e concimazioni, può essere ripetuto ogni 6/7 giorni in base alle condizioni stagionali e nei periodi più critici per rendere l'ambiente sgradito ad insetti ed agenti patogeni.</i></p>	

Compatibilità:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità sulle colture su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Avvertenze:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.