



BioDea

SCHEMA COLTURALE

"il girasole"

Famiglia: Asteraceae



TRATTAMENTO PRE- SEMINA	DOSE
Nebulizzazione del terreno 15 gg. prima della semina	1:100 o 1lt/hl
TRATTAMENTO POST SEMINA	DOSE
bagnatura	3/5 litri/ha
TRATTAMENTI FOGLIARE	DOSE
<p>si consigliano almeno 3 trattamenti fogliari alla post emergenza, formazione iniziale delle prime foglie, alla formazione della calatide,</p> <p>Ripetere eventuali trattamenti fogliare nella fase di crescita attiva del girasole</p> <p><i>intervenire in concomitanza di trattamenti fitosanitari e concimazioni, può essere ripetuto ogni 6/7 giorni in base alle condizioni stagionali e nei periodi più critici per rendere l'ambiente sgradito ad insetti ed agenti patogeni.</i></p>	<p>200-250 ml / hl</p> <p>200-250 ml/hl</p>
TRATTAMENTI FERTIRRIGAZIONE	DOSE
Trattamento fertirrigazione di soccorso aggiungere nell'ultima fase di irrigazione	3/5 litri

Compatibilità:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità sulle colture su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Avvertenze:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.