



BioDea

SCHEMA COLTURALE

*"comprende circa 13000 specie, fra cui, principalmente,
piante erbacee, ma anche alberi, arbusti o liane."*

Famiglia: Composite



alcuni esempi: *assenzio,
carciofo, camomilla, cardo,
cicoria, dragoncello*

TRATTAMENTO SEMINA fertirrigazione	DOSE
IN SEMENZAIO: Iniziare bagnando il substrato all'atto della semina e continuare fino al momento del trapianto, con interventi ogni 4 giorni	1:800 o 125 ml/hl
TRATTAMENTO TRAPIANTO fertirrigazione	DOSE
in fase di trapianto della piantina 4°-6° foglia	1:500 o 200 ml/hl
TRATTAMENTI FOGLIARE	DOSE
4°/6° foglia	1:600 o 167 ml/hl
Dopo la 7° foglia	1:500 o 200 ml/hl
Durante lo sviluppo vegetativo fino alla raccolta	1:500 o 200 ml/hl
<i>Ripetere ogni 6/7 giorni in base alle condizioni stagionali e per rendere l'ambiente gradito agli insetti e parassiti nei periodi più critici, fare il trattamento fogliare dopo ogni sfalcio.</i>	
FERTIRRIGAZIONE	DOSE
4°/6° foglia	1:500 o 200 ml/hl
Dopo la 7° foglia	1:300 o 333 ml/hl ripetere ogni 14 giorni
<i>Ripetere ogni 10-15 giorni in base ai fabbisogni distribuire nell'ultima fase di irrigazione</i>	

Compatibilità:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità sulle colture su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Avvertenze:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.