BioDea®

SCHEDA COLTURALE

"il Carciofo"

Famiglia: Composite

Nuovi impianti

TRATTAMENTO SEMINA fertirrigazione	DOSE
IN PIENO CAMPO: bagnare il terreno subito dopo la semina diretta in campo	1:600 o 167 ml/hl

TRATTAMENTO TRAPIANTO fertirrigazione	DOSE
in fase di trapianto dei carducci con almeno 4°-5° foglie o degli ovuli o delle piantine con pane di terra	1:400 o 250 ml/hl

TRATTAMENTI FOGLIARE	DOSE
5°/7° foglia	1:600 o 167 ml/hl
Dopo la 7° foglia	1:500 o 200 ml/hl
Durante lo sviluppo vegetativo	1:500 o 200 ml/hl
Capolino inviluppato	1:500 o 200 ml/hl
Capolino visibile	1:500 o 200 ml/hl
Ingrossamento e maturazione capolino principale	1:500 o 200 ml/hl
Ingrossamento e maturazione capolini secondari	1:500 o 200 ml/hl
Intervento post dicioccatura o scarducciatura	1:500 o 200 ml/hl

Ripetere ogni 6/7 giorni in base alle condizioni stagionali e per rendere l'ambiente sgradito agli insetti e parassiti nei periodi più critici, fare il trattamento fogliare dopo ogni sfalcio.

FERTIRRIGAZIONE	DOSE
5°/7° foglia	1:500 o 200 ml/hl
Dopo la 7° foglia	1:300 o 333 ml/hl ripetere ogni 14 giorni
In fase di ripresa post-riposo vegetativo	1:500 o 200 ml/hl

Ripetere ogni 10-15 giorni in base ai fabbisogni distribuire nell'ultima fase di irrigazione

Compatibilità:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità sulle colture su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Avvertenze:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.

Via Delle Case Rosse N 16, Civitella in Val di Chiana (AR) 52041 +39 0575 1785816 esperia.commerce@gmail.com