



BioDea

SCHEDA COLTURALE

*"Vigneto"*



## Nuovi impianti

PRIMA DEL TRAPIANTO DI NUOVE BARBATELLE, COME EFFETTO STARTER ED ANTISTRESS EFFETTUARE INZAFFARDATURA DELLE PIANTINE CON UNA SOLUZIONE DI:  
**DISTILLATO DI LEGNO AL 1:700 OPPURE 143ML/HL IN ACQUA PER 6-8 ORE**  
PER OTTENERE UNA MIGLIORE RADICAZIONE E ATTECCHIMENTO, UNA MIGLIORE E GRADUALE LIGNIFICAZIONE DELLA PIANTA.

*Post-trapianto prevedere una diluizione del prodotto in dose 1:400 o 250 ml/hl nella ultima fase di irrigazione*

TRATTAMENTI FOGLIARE	DOSE
POST POTATURA DI ALLEVAMENTO	1:300 O 333 ML/HL
POST EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI (GELATE)	1:500 O 200 ML/HL
DURANTE LE FASI VEGETATIVE	1:500 O 200 ML/HL
RIPETERE OGNI 30 GIORNI	

  

IMPIANTI CON FERTIRRIGAZIONE	DOSE
TRATTAMENTO MENSILE	1:200 O 500 ML/HL
<i>Ripetere ogni 30 giorni distribuire nell'ultima fase di irrigazione</i>	

## Piante in produzione

TRATTAMENTI FOGLIARE	DOSE
POST POTATURA	1:300 O 333 ML/HL
PRIMI SVILUPPI VEGETATIVI	1:600 O 166 ML/HL
TRA ALLEGAGIONE E INVAIATURA	1:500 O 200 ML/HL
TRA INVAIATURA E MATURAZIONE	1:500 O 200 ML/HL
<i>Ripetere ogni 7/10 giorni in base alle condizioni stagionali e per rendere sgradito l'ambiente agli insetti e parassiti nei periodi più critici</i>	

  

NEBULIZZAZIONE SUL TERRENO	DOSE
POST- RACCOLTA	1:100 O 1.000 ML/HL



L'azienda vitivinicola



ha scelto BioDea per la sua coltivazione, ascolta la sua testimonianza



<https://youtu.be/KMcgRZjiQLE>

### Compatibilità:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.

Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità sulle colture su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

### Avvertenze:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.