



BioDea

SCHEMA COLTURALE

"il Castagno"

Famiglia: Fagaceae



Nuovi impianti

Prima del trapianto dell'astone a radice nuda, come effetto starter ed antistress effettuare inzaffardatura delle piantine con una soluzione di Distillato di Legno al 1:700 oppure 143ml/hl in acqua per 6-8 ore per ottenere una migliore radicazione e attecchimento, una migliore e graduale lignificazione della pianta. Trapianto con pane di terra prevedere a seguire una diluizione 1:400 o 250 ml/hl nella ultima fase di irrigazione.

TRATTAMENTI FOGLIARE	DOSE
Post interventi di potatura di allevamento e cimatura irrorare anche tutto il tronco in particolare alla base della pianta.	1:300 o 333 ml/hl
nebulizzazione al suolo, fine inverno inizio primavera, o in concomitanza alla potatura al secco della pianta	1:100 o 1000 ml/hl
Post eventi atmosferici avversi (gelate e diluvi)	1:300 o 333 ml/hl
Dal trapianto a circa il 6° anno trattamento ogni 7 max 15 giorni	1:500 o 200 ml/hl
FERTIRRIGAZIONE	DOSE
trattamento periodico estivo	1:200 o 500 ml/hl
<i>Ripetere ogni 7-15 giorni distribuire nell'ultima fase di irrigazione</i>	

Impianti in produzione

Ripetere ogni 7/10 giorni in base alle condizioni stagionali e per rendere l'ambiente sgradito agli insetti e parassiti nei periodi più critici

TRATTAMENTI FOGLIARE	DOSE
Post raccolta	1:500 o 200 ml/hl
Post potatura di produzione manuale o meccanica	1:300 o 333 ml/hl
Gemme dormienti irrorare bene anche il tronco e terreno	1:300 o 333 ml/hl
Sviluppo gemme dal rigonfiamento, apertura fino alla caduta delle perule	1:500 o 200 ml/hl
Sviluppo foglie dalle prime foglie distinte ma ripiegate fino alle foglie completamente distese	1:500 o 200 ml/hl
Dalla comparsa delle infiorescenze fino allo sviluppo completo delle stesse	1:500 o 200 ml/hl
Fioritura e allegazione	1:600 o 166 ml/hl
Post allegazione e crescita del frutto	1:500 o 200 ml/hl
Dall'invaiaatura fino alla maturazione e caduta dei frutti	1:500 o 200 ml/hl
FERTIRRIGAZIONE	DOSE
Durante le fasi vegetative primaverili - estive	1:250 o 400 ml/hl
Durante la fase di riposo vegetativa autunno-vernina	1:300 o 333 ml/hl
<i>Ripetere ogni 15-30 giorni in base ai fabbisogni distribuire nell'ultima fase di irrigazione</i>	

Compatibilità:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità sulle colture su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Avvertenze:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.