



BioDea

SCHEMA COLTURALE

"correntemente denominate leguminose, sono in senso ampio, piante erbacee, arbusti, alberi o liane. Si tratta di una famiglia "cosmopolita", presente nelle zone più fredde come in quelle tropicali."

Famiglia: Fabacee



Alcuni esempi: favino,
fagiolo, pisello, fagiolini,
lenticchia, arachide,
soia,

TRATTAMENTO SEMENZAIO	DOSE
Iniziare bagnando il substrato all'atto della semina e continuare fino al momento del trapianto, con interventi settimanali	1:800 o 125 ml/hl
TRATTAMENTO TRAPIANTO fertirrigazione	DOSE
Prevedere una fertirrigazione in fase di trapianto 5°/7° foglia	1:400 o 250 ml/hl
TRATTAMENTI FOGLIARE	DOSE
5°/7° foglia	1:600 o 167 ml/hl
Dopo la 7° foglia	1:500 o 200 ml/hl
Prefioritura	1:500 o 200 ml/hl
Post allegazione	1:500 o 200 ml/hl
Ingrossamento Baccello	1:500 o 200 ml/hl
<i>Ripetere ogni 7/10 giorni in base alle condizioni stagionali e per rendere l'ambiente sgradito agli insetti e parassiti nei periodi più critici</i>	
FERTIRRIGAZIONE	DOSE
5°/7° foglia	1:500 o 200 ml/hl
Dopo la 7° foglia	1:300 o 333 ml/hl ripetere ogni 14 giorni
<i>Ripetere ogni 15-30 giorni in base ai fabbisogni distribuire nell'ultima fase di irrigazione</i>	

Compatibilità:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità sulle colture su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Avvertenze:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.