



BioDea

SCHEMA COLTURALE

"Agrumi"

Famiglia: Rutaceae



Nuovi impianti

PRIMA DEL TRAPIANTO DELL'ASTONE A RADICE NUDA, COME EFFETTO STARTER ED ANTISTRESS EFFETTUARE INZAFFARDATURA DELLE PIANTINE CON UNA SOLUZIONE DI DISTILLATO DI LEGNO AL 1:700 OPPURE 143ML/HL IN ACQUA PER 6-8 ORE PER OTTENERE UNA MIGLIORE RADICAZIONE E ATTECCIMENTO, UNA MIGLIORE E GRADUALE LIGNIFICAZIONE DELLA PIANTA. TRAPIANTO DELL'ASTONE CON PANE DI TERRA PREVEDERE NELL'ULTIMA FASE DI IRRIGAZIONE UNA DILUIZIONE 1:400 O 250 ML/HL DEL PRODOTTO.

TRATTAMENTI FOGLIARE

DOSE

POST INTERVENTI DI POTATURA DI ALLEVAMENTO E CIMATURA, IRRORARE ANCHE TUTTO IL TRONCO IN PARTICOLARE ALLA BASE DELLA PIANTA.	1:300 O 333 ML/HL
POST EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI (GELATE) DAL TRAPIANTO CIRCA 8°-10 ° FOGLIA VERA	1:300 O 333 ML/HL
TRATTAMENTO MENSILE	1:500 O 200 ML/HL
POST INNESTO AD 1 ANNO DALLA SEMINA	1:500 O 200 ML/HL

IMPIANTI CON FERTIRRIGAZIONE

DOSE

TRATTAMENTO MENSILE	1:250 O 400 ML/HL
---------------------	-------------------

Ripetere ogni 30 giorni distribuire nell'ultima fase di irrigazione

Piante in produzione

TRATTAMENTI FOGLIARE

DOSE

POST RACCOLTA	1:500 O 200 ML/HL
POST POTATURA DI PRODUZIONE MANUALE O MECCANICA	1:500 O 200 ML/HL
POST POTATURA DI DIRADAMENTO, CIMATURE	1:500 O 200 ML/HL
FIORITURA E ALLEGAGIONE	1:600 O 166 ML/HL
DA POST ALLEGAGIONE A PRE-INVAIATURA FRUTTI	1:500 O 200 ML/HL
DALL'INVAIATURA FINO ALLA MATURAZIONE	1:500 O 200 ML/HL

Ripetere ogni 7/10 giorni in base alle condizioni stagionali e per rendere l'ambiente sgradito agli insetti e parassiti nei periodi più critici

FERTIRRIGAZIONE

DOSE

DURANTE LE FASI VEGETATIVE PRIMAVERILI -ESTIVE	1:250 O 400 ML/HL
DURANTE LE FASI VEGETATIVE AUTUNNO - VERNINE	1:300 O 333 ML/HL

Ripetere ogni 15-30 giorni in base ai fabbisogni distribuire nell'ultima fase di irrigazione



Visita il canale YouTube BioDea e guarda le prove in campo del Distillato di Legno sugli agrumi



<https://youtu.be/EnI2OnakGoc>

Compatibilità:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.

Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità sulle colture su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Avvertenze:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.