



BioDea

SCHEMA COLTURALE

"caratteristica fondamentale è la disposizione dei fiori a ombrello, da cui il loro nome. Alcune specie, come la cicuta, possono essere tossiche, mentre altre sono commestibili"

Famiglia: Ombrellifere



alcuni esempi: aneto, anice,
angelica, carota, cumino carvi,
sedano, cerfoglio,
coriandolo, cumino, finocchio,
pastinaca, prezzemolo

TRATTAMENTO ALLA SEMINA IN FERTIRRIGAZIONE DOSE

Iniziare bagnando il terreno all'atto della semina, con interventi ogni 3-4 giorni	1:800 o 125 ml/hl
--	-------------------

TRATTAMENTI FOGLIARE**DOSE**

5°/6° foglia	1:600 o 167 ml/hl
Dopo la 6° foglia	1:500 o 200 ml/hl
Crescita del tubero o radice fino alla raccolta	1:500 o 200 ml/hl

Ripetere ogni 6/7 giorni in base alle condizioni stagionali e per rendere l'ambiente sgradito agli insetti e parassiti nei periodi più critici

FERTIRRIGAZIONE**DOSE**

5°/6° foglia	1:500 o 200 ml/hl
Dopo la 6° foglia fino alla raccolta del tubero o radice	1:300 o 333 ml/hl ripetere ogni 14 giorni

Ripetere ogni 10-15 giorni in base ai fabbisogni distribuire nell'ultima fase di irrigazione

Compatibilità:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità sulle colture su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Avvertenze:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.