



TRATTAMENTI semenzaio fertirrigazione	DOSE
IN SEMENZAIO: Iniziare bagnando il substrato all'atto della semina e continuare fino al momento del trapianto, con interventi settimanali	1:800 o 125 ml/hl
IN PIENO CAMPO: bagnare il terreno subito dopo la semina diretta in	1:600 o 167 ml/hl
TRATTAMENTI trapianto fertirrigazione	DOSE
in fase di trapianto della piantina 4°-5° foglia	1:500 o 200 ml/hl
TRATTAMENTI FOGLIARI	DOSE
5°/7° foglia	1:600 o 167 ml/hl
Dopo la 7° foglia	1:500 o 200 ml/hl
Durante lo sviluppo vegetativo fino agli sfalci periodici compresi	1:500 o 200 ml/hl
<b>Ripetere ogni 6/7 giorni in base alle condizioni stagionali e per rendere l'ambiente sgradito agli insetti e parassiti nei periodi più critici, fare il trattamento fogliare dopo ogni sfalcio.</b>	
FERTIRRIGAZIONE	DOSE
5°/7° foglia	1:500 o 200 ml/hl
Dopo la 7° foglia 1:300 o 333 ml/hl ripetere ogni 14 giorni	
Tecnica del FLOATING SYSTEM TRATTAMENTO SEMINA	DOSE
Alla semina SU CONTENITORE ALVEOLARE GALLEGGIANTE IN ACQUA	1:600 o 167 ml/hl
TRATTAMENTI FOGLIARI	DOSE
2°/4° foglia	1:800 o 125 ml/hl
4°/7° foglia	1:600 o 167 ml/hl
Dopo la 7° foglia	1:600 o 167 ml/hl
Durante lo sviluppo vegetativo fino agli sfalci periodici compresi	1:600 o 167 ml/hl
<b>Ripetere ogni 5/6 giorni in base alle condizioni stagionali e per rendere l'ambiente sgradito agli insetti e parassiti nei periodi più critici, fare il trattamento fogliare dopo ogni sfalcio.</b>	

\*Adatto al tutta la famiglia delle Labiate: *basilico, erba gatta, issopo, lavanda, maggiorana, marrubio, melissa, origano, rosmarino, santoreggia, salvia, timo*

